

点鼻薬ブセレリンを使い忘れた場合

【使用方法】

□1日3回（8時間おき）両鼻腔へ1回ずつ噴霧（900μg/日）

- 1) 気付いた時点ですぐにスプレーする
- 2) 以後、通常のスケジュールに戻す。
- 3) 次に使用する時間が2時間以内の場合は、時間を空ける。
- 4) できる限り1日3回使用する。



例) スケジュールが 8時 16時 24時 の1日3回 だとした場合、

ケース1	8時 →14時	16時	24時
------	---------	-----	-----

8時の使用を忘れ、14時に気付いたら
→14時 16時 24時 に1日3回スプレー

ケース2	8時 →15時	16時 →15時	24時
------	---------	----------	-----

8時の使用を忘れ、15時に気付いたら
→15時（2時間空けて）17時 24時 に1日3回スプレー

ケース3	8時	16時 →22時	24時
------	----	----------	-----

8時、14時の使用を忘れ、22時に気付いたら
→22時 24時 にスプレー（1日2回しかできない）
→翌日は 8時 16時 24時

ケース4	8時	16時 →23時	24時 →25時
------	----	----------	----------

8時、14時の使用を忘れ、23時に気付いたら
→23時（2時間空けて）25時（=翌日1時） にスプレー（1日2回しかできない）
→翌朝からは 8時 16時 24時

ケース5	8時	16時	24時
------	----	-----	-----

8時、14時の使用を忘れ、23時に気付いたら
→すぐに にスプレー（1日1回しかできない）
→翌朝からは 8時 16時 24時

ケース6

丸1日忘れたら、その治療周期はキャンセルとなりますので、お電話でご相談ください。